



**UZEM** | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ



1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi  
Matematik Bölümü  
Dijital Ders Platformu

Cebir 2  
Halkada Özellikler

Prof. Dr. Şenol EREN

Ders 2

Teorem 1.1.14:  $R$  birimli bir halka olsun. Bu durumda

i)  $U_R \neq \emptyset$

ii)  $0_R \notin U_R$

iii)  $\forall u, v \in U_R$  için  $u \cdot v \in U_R$  dir.

İspat: i)  $1_R \cdot 1_R = 1_R \Rightarrow 1_R \in U_R \Rightarrow U_R \neq \emptyset$

ii)  $0_R \in U_R$  olsun.  $0_R \cdot v = v \cdot 0_R = 1_R$  olacak şekilde  $v \in R$  vardır. Buradan  $0_R = 1_R$  ilişkisi elde edilir.

iii)  $u, v \in U_R \Rightarrow u \cdot a = a \cdot u = 1_R$  ve  $v \cdot b = b \cdot v = 1_R$  olacak şekilde  $\exists a, b \in R$  vardır.

$(u \cdot v)(ba) = u(vb)a = u \cdot a = 1_R$

$(ba)(u \cdot v) = b(au)v = b \cdot v = 1_R$  olup  $u \cdot v \in U_R$  bulunur.

**Tanım 1.1.15**  $R$  birimli bir halka olsun.  $R$ 'nin sıfırdan farklı her elemanı birimsel ise  $R$ 'ye Bölme Halkası denir.

**Tanım 1.1.16** Sıfır bölensiz bir halkaya tam halka denir. Birimli, değişmeli ve sıfır bölensiz bir halkaya Tamlik Bölgesi (TB) denir.

**Örnek 1.1.17**  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  bir tamlik bölgesidir.

**Örnek 1.1.18**  $p$  asal tam sayı olmak üzere  $(\mathbb{Z}_p, \oplus, \odot)$  bir tamlik bölgesidir.

---

**Teorem 1.1.19**  $R$  bir halka ve  $c \in R$  sıfır bölen olmayan bir eleman olsun.  $\forall a, b \in R$  için  $ac = bc$  (veya  $ca = cb$ ) ise  $a = b$  dir.

**İspat:**  $ac = bc \Rightarrow ac - bc = 0_R \Rightarrow (a - b) \cdot c = 0_R$  olur.  $c$  sıfır bölen olmadığından  $a - b = 0_R$  olup  $a = b$  bulunur.  $ca = cb \Rightarrow a = b$  için benzer şekilde gösterilir.

---

**Sonuç 1.1.20**  $R$  bir tam halka  $\Leftrightarrow \forall 0_R \neq c \in R$  ile sağdan ve soldan kısaltma özelliği sağlanır.

**Sonuç 1.1.21**  $R$  bir tam halka ise  $0_R \neq a \in R$  için  $ax=b$  olacak şekilde  $\exists x \in R$  varsa teklikle belirlidir. Fakat böyle bir  $x$  elemanı olmayabilir.

**İspat:**  $ax=b$  olacak şekilde  $x \in R$  olsun. tekliğini göstirelim.  $ax_1=b$ ,  $ax_2=b$  şartını sağlayan  $x_1, x_2 \in R$  olsun  $ax_1=ax_2 \Rightarrow x_1=x_2$  bulunur.

---

**Tanım 1.1.22**  $R$  birimli ve değişmeli bir halka olsun.  $R - \{0_R\} = R^*$  kümesi ikinci işleme göre bir değişmeli grup ise  $R$ 'ye cisim denir. Tanım ve sonuç 1.1.21'e göre bir cisimde sıfırdan farklı her elemanın karşılıklı tersi var ve tektir.

**Örnek 1.1.23**  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  birer cisimdir.

---

**Tanım 1.1.24**  $R$  bir halka  $x \in R$  olsun.  $x^2 = x$  ise  $x \in R$ 'ye idempotent eleman denir. Bir halkanın sıfırı ve varsa birimi idempotent elemanlardır.

**Tanım 1.1.25** Birimli bir  $R$  halkasının her elemanı idempotent ise  $R$  halkasına Boole Halkası denir.

**Örnek 1.1.25**  $\mathbb{Z}_2$  bir Boole Halkasıdır.

---

**Tanım 1.1.26**  $R$  bir halka olsun. Eğer  $\forall a \in R$  için  $n \cdot a = 0_R$  olacak şekilde  $n > 0$  tam sayısı varsa, böyle  $n > 0$  tam sayılarının en küçüğüne  $R$ 'nin karakteristiği denir. Bu özelliğe hiç bir  $n$  yoksa  $R$  halkasının karakteristiği sıfırdır denir.  $\text{Krk} R$  ile gösterilir.

**Örnek 1.1.27**  $\text{Krk} \mathbb{Z} = \text{Krk} \mathbb{Q} = \text{Krk} \mathbb{R} = 0$  dir.

$\text{Krk} \mathbb{Z}_6 = 6$  dir.

---



**Teorem 1.1.28**  $R$  bir Boole Halkası olsun. Bu durumda  $R$ 'nin krakteristiği 2 ve  $R$  değişmelidir.

**ispat:**  $x \in R$  alalım.

$$\begin{aligned} x+x &= (x+x)^2 = (x+x)(x+x) = x(x+x) + x(x+x) \\ &= x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x+x+x+x \Rightarrow 0_R = 2x \text{ olup} \end{aligned}$$

$x$  keyfi olduğundan  $\text{krak}(R) = 2$  bulunur.

$x, y \in R$  alalım.

$$x+y = (x+y)^2 = (x+y)(x+y) = x^2 + xy + yx + y^2$$

$0_R = xy + yx$  bulunur.

$$\begin{aligned} xy + yx = 0_R &= x^2 + xy + yx + y^2 = x^2 + yx + xy + y^2 \\ &= yx \text{ bulunur.} \end{aligned}$$



**UZEM** | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ



Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi  
Matematik Bölümü  
Dijital Ders Platformu

Teşekkürler

Prof. Dr. Şenol EREN

Cebir II

Ders 2