



**UZEM** | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ



**Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi  
Matematik Bölümü  
Dijital Ders Platformu**

**Soyut Matematik II  
Rasyonel Sayılar**

**Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DERLİ**

**Ders 4**

## RASYONEL SAYILAR

$2x=3$  denkleminin tam sayılarla çözümü yoktur. Bu denklemi çözmeden demek  $2x \geq 3$ ,  $2x \leq 3$  eşitsizliklerinin ortak çözümünü bulmak demektir.

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : 2x \geq 3\} = \{2, 3, 4, \dots\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} : 2x \leq 3\} = \{1, 0, -1, -2, \dots\} \text{ olsun.}$$

$A \cap B = \emptyset$  olduğundan  $2x=3$  denkleminin  $\mathbb{Z}$  sayı sisteminde çözümü yoktur. Dolayısıyla  $\mathbb{Z}$  genişletilmelidir.

**Tanımı:**  $(m,n), (p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  için

$$(m,n) \beta (p,q) \iff mq = np$$

şeklindedir.

**Önerme:** Yukarıda tanımlanan  $\beta$  bağıntısı  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  üzerinde bir denklik bağıntısıdır.

**Ispat:** i) yarışma özellilī:

$\forall (m,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  için  $mn = nm$  olduğundan  $(m,n) \beta (m,n)$  dir.

ii) simetri özellilī:

$\forall (m,n), (p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  için  $(m,n) \beta (p,q) \Rightarrow (p,q) \beta (m,n)$  mi?

$$(m,n) \beta (p,q) \Rightarrow mq = np$$

$$\Rightarrow np = mq$$

$$\Rightarrow pn = qm \Rightarrow (p,q) \beta (m,n)$$

iii) geçişne özellilī:

$\forall (m,n), (p,q), (r,s) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  için

$$(m,n) \beta (p,q) \Rightarrow mq = np$$

$$(p,q) \beta (r,s) \Rightarrow ps = qr$$

$$\bullet p=0 \Rightarrow m=0=r \Rightarrow ms = nr \Rightarrow (m,n) \beta (r,s)$$

$$\bullet p \neq 0 \Rightarrow m(ps) = m(qr)$$

$$= (mq)r = (np)r$$

$$\Rightarrow m(sr) = (nr)p$$

$$\Rightarrow (ms)p = (nr)p \Rightarrow ms = nr \Rightarrow (m,n) \beta (r,s)$$

Tanımı:  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*/\beta = \{ \overline{(m,n)} : (m,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \}$

bölüm kumesine rasyonel sayılar kümesi denir.

$$\overline{(m,n)} = \{ (x,y) : (x,y) \beta (m,n) \} = \{ (x,y) : x_n = y_m \}$$

denklik sınıflarına da rasyonel sayı denir.

$\Theta_1 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*/\beta$ ,  $\overline{(m,n)} = [cm, n]$  ile gösterilir.

Tanımı:  $[cm, n], [p, q] \in \Theta$  için

$$\therefore [cm, n] \oplus [p, q] = [cmq + np, nq] \text{ ye } [cm, n], [p, q]$$

rasyonel sayıların toplamı

$$\therefore [cm, n] \odot [p, q] = [cp, nq] \text{ ye } [cm, n], [p, q]$$

rasyonel sayıların çarpımı

denir.

Yukarıda verilen  $\oplus, \odot$  işlemler: iyi tanımlıdır.

**Überme:**  $[c_{m,n}]$ ,  $[c_{p,q}]$ ,  $[c_{r,s}] \in \Theta$  iain

- i)  $[c_{m,n}] \oplus [c_{p,q}] = [c_{p,q}] \oplus [c_{m,n}]$
- ii)  $[c_{m,n}] \oplus ([c_{p,q}] \oplus [c_{r,s}]) = ([c_{m,n}] \oplus [c_{p,q}]) \oplus [c_{r,s}]$
- iii)  $[c_{m,n}] \odot [c_{p,q}] = [c_{p,q}] \odot [c_{m,n}]$
- iv)  $[c_{m,n}] \odot ([c_{p,q}] \odot [c_{r,s}]) = ([c_{m,n}] \odot [c_{p,q}]) \odot [c_{r,s}]$
- v)  $[c_{m,n}] \odot ([c_{p,q}] \oplus [c_{r,s}]) = ([c_{m,n}] \odot [c_{p,q}]) \oplus ([c_{m,n}] \odot [c_{r,s}])$

**Tanimi:**  $[c_{m,n}] \in \Theta$  iain  $[(-m,n)] = -[c_{m,n}]$

**Überme:**  $[c_{m,n}] \in \Theta$  iain

- i)  $[c_{m,n}] \oplus [c_{(0,1)}] = [c_{m,n}]$
- ii)  $[c_{m,n}] \oplus (-[c_{m,n}]) = [c_{(0,1)}]$
- iii)  $[c_{m,n}] \odot [c_{(1,1)}] = [c_{m,n}]$
- iv)  $m \neq 0 \Rightarrow [c_{m,n}] \odot [c_{n,m}] = [c_{(1,1)}]$

Tanımı: i)  $[c_{m,n}] \in \Theta$  iken  $[c_{m,n}]$  yerine  $\frac{m}{n}$ ,  $\oplus$  yerine +,  
 $\odot$  yerine  $\cdot$  alınırsa bu takdirde iki rasyonel sayının toplamı,  
çarpımı ve esitliği

$$\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{mq+np}{nq} \quad \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} = \frac{mp}{nq}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q} \iff mq = np$$

şeklinde ifade edilir.

ii)  $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \Theta$   
 $m \longmapsto f(m) = \frac{m}{1}$

şeklinde tanımlanırsa  $\frac{m}{1} = m$  eşitliği dikkate alınarak  $\mathbb{Z} \subseteq \Theta$   
kapsamı geçerli olacağından  $\mathbb{Z}$  tam sayılar kümesi genişletilmiş  
olacaktır.

Örnek:  $2x=3$  denklem:

$$[(2,1)] [c_{m,n}] = [(3,1)]$$

$$\Rightarrow [(2m,n)] = [(3,1)]$$

$$\Rightarrow 2m = 3n \Rightarrow m=3, n=2 \Rightarrow x = [c_{m,n}] = \frac{3}{2}$$

Tanım:  $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$  olsun.

i)  $\frac{m}{n} > 0 \Leftrightarrow mn > 0 \Rightarrow \frac{m}{n}$  ye pozitif rasyonel sayı

ii)  $\frac{m}{n} < 0 \Leftrightarrow mn < 0 \Rightarrow \frac{m}{n}$  ye negatif rasyonel sayı  
denir.

Önerme: ( $\mathbb{Q}$  nun ısalık özelligi)

Her bir  $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$  iain  $\frac{m}{n} > 0$ ,  $\frac{m}{n} = 0$  ya da  $\frac{m}{n} < 0$

Tanım:  $x, y \in \mathbb{Q}$  iain  $x \leq y \Leftrightarrow x = y \vee y - x > 0$

Önerme:  $\mathbb{Q}$  rasyonel sayılar kumesi yukarıda verilen tanıma göre tam sıralıdır.

İspat: i) yansima özelligi:

$\forall x \in \mathbb{Q}$  iam  $x \leq x$  olduğundan yansiyandır.

ii) ters simetri: özelligi

$\forall x, y \in \mathbb{Q}$  iam  $x \leq y \wedge y \leq x$  olsun

$x = \frac{p}{q}, y = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$  olsalı.

$$x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow \frac{p}{q} - \frac{r}{s} \geq 0 \wedge \frac{r}{s} - \frac{p}{q} \geq 0$$

$$\Rightarrow qn(pn - mq) \geq 0 \wedge qr(rq - ps) \geq 0$$

$$\Rightarrow qn(pn - mq) = 0, \quad qn \neq 0 \Rightarrow pn - mq = 0$$

$$\Rightarrow x = y$$

iii) genisme özelligi:

$\forall x, y, z \in \mathbb{Q}$  iin  $x \leq y \wedge y \leq z$  olun

$x = \frac{p}{q}, y = \frac{r}{s}, z = \frac{t}{u} \in \mathbb{Q}$  iin

$$qn(pn - mq) \geq 0 \Rightarrow n^2pq - q^2mn \geq 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$qs(rs - ps) \geq 0 \Rightarrow q^2rs - s^2pq \geq 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$   $s^2$  ile  $\textcircled{2}$   $n^2$  ile çarpılırsa

$$s^2n^2pq - s^2q^2mn \geq 0 \wedge n^2q^2rs - n^2s^2pq \geq 0$$

$$\Rightarrow q^2(n^2rs - s^2mn) \geq 0 \Rightarrow (nr - sm)ns \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{r}{s} - \frac{p}{q} \geq 0 \Rightarrow x \leq z$$

Karsilaşturma yapılabildiğinden  $(\mathbb{Q}, \leq)$  tam sıralıdır.

### Teorem: ( $\mathbb{Q}$ nun Arşimet Özelliği)

Bir  $x \in \mathbb{Q}$  rasyonel sayısı için  $x < p$  olarak şekilde  $p \in \mathbb{N}$  doğal sayısı vardır.

İspat: i)  $\frac{m}{n} \leq 0 \Rightarrow p=1$  alınır

ii)  $\frac{m}{n} > 0$  olsun. Bu durumda  $m,n > 0$  dir. O halde iki durum söz konusudur.

- $n > 0 \Rightarrow m > 0$

$$mn^2 + n^2 - mn > 0 \Rightarrow (m+1) - \frac{m}{n} > 0$$

$$\Rightarrow \frac{m}{n} < m+1$$

$$\Rightarrow p = m+1 \text{ olur.}$$

- $n < 0 \Rightarrow m < 0$

$$-mn^2 + n^2 - mn > 0 \Rightarrow (-m+1) - \frac{m}{n} > 0$$

$$\Rightarrow -m+1 > \frac{m}{n} \Rightarrow p = -m+1 \text{ olur.}$$



**UZEM** | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ



**Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi  
Matematik Bölümü  
Dijital Ders Platformu**

Teşekkürler

Dr. Öğr. Gör. Abdullah DERİLİ

Soyut Matematik